

Информация о седативных препаратах при лечении зубов

Препарат (Мидазолам/ Midazolam) принимается примерно за 20 минут до лечения зубов, чтобы уменьшить тревожность и страх. Препарат также оказывает расслабляющее действие на мышцы, что может влиять на баланс, и что также следует учитывать после лечения.

Ощущения от лечения обычно не выражены интенсивно, потому что препарат влияет на способность к запоминанию.

Дети иногда плачут во время или после лечения, несмотря на прием препарата. Важно дать положительную картину хода событий, так как это то, что ребенок запомнит!

Прием пищи

Легкий прием пищи за 2 часа до процедуры. (Избегайте грейпфрутовый сок.)

После лечения

Действие препарата сохраняется в организме в течение нескольких часов. Поэтому мы хотим, чтобы вы оставались в клинике не менее 1 часа после приема препарата.

Для взрослых

Вождение автомобиля запрещено в течение 12 часов после лечения. Из клиники взрослых должны сопровождать по пути домой.

Для детей

При поездке домой на автомобиле ребенок должен сидеть, как обычно, в автокресле или пристегнутым ремнем безопасности, а рядом должен находиться взрослый. Остальную часть дня ребенок должен находиться под присмотром взрослого. Если ребенок засыпает, он должен лежать на боку. Следует избегать игр на свежем воздухе, езды на велосипеде, всевозможные лазания и подъемы.

Если у вас есть вопросы звоните:

.....
.....