

Інформація про седативні препарати при лікуванні зубів

Препарат (Мідазолам/Midazolam) приймається приблизно за 20 хвилин до лікування зубів, щоб зменшити тривожність та страх. Препарат також має розслаблюючу дію на м'язи, що може впливати на баланс, і що також слід враховувати після лікування.

Відчуття від лікування зазвичай не виражені інтенсивно, тому що препарат впливає на здатність до запам'ятовування.

Діти іноді плачуть під час або після лікування, незважаючи на прийом препарату. Важливо дати позитивну картину перебігу подій, оскільки це те, що дитина запам'ятає!

Приймання їжі

Легка їда за 2 години до процедури. (Уникайте грейпфрутовий сік)

Після лікування

Дія препарату зберігається в організмі протягом кількох годин. Тому ми хочемо, щоб ви залишалися у клініці не менше 1 години після прийому препарату.

Для дорослих

Водіння автомобіля заборонено протягом 12 годин після лікування. З клініки дорослих повинні супроводжувати дорогою додому.

Для дітей

При поїздці додому на автомобілі дитина повинна сидіти, як завжди, в автокріслі або пристебнутим ременем безпеки, а поруч має бути дорослий. Решту дня дитина повинна перебувати під наглядом дорослого. Якщо дитина засинає, вона повинна лежати на боці. Слід уникати ігор на свіжому повітрі, їзди на велосипеді, всілякі лазіння та підйоми.

Якщо у вас є питання дзвоніть:

.....
.....