

Efter tandborttagning och operation

Efter att ha tagit bort en tand eller genomfört någon annan operation i munnen, finns det några saker som du bör tänka på:

- Undvik att skölja munnen, äta och röka innan bedövningen försvunnit. Vänta minst 2 timmar.
- Borsta inte direkt på såret eller området närmast såret under den första tiden. I övrigt kan du borsta tänderna som vanligt.
- Sug inte på såret och pilla inte i det med tungan! Peta inte i såret, även om det känns som om det har fastnat någonting.

Besvär efteråt

Blödning

Såret blöder nästan alltid lite efter behandlingen. Det är helt normalt och absolut ingenting att oroa sig över. Om det dröjer innan blödningen upphör kan du använda de kompresser som du fått med dig från oss. Fukta dem i lite ljummet vatten och bit ihop på kompresserna i cirka 15-20 minuter.

Svullnad

Ibland reagerar kroppen genom att området runt såret svullnar upp. Detta kan göra att det blir lite svårare än vanligt att gapa. Svullnad och gapsvårigheter ska efterhand bli bättre och gå tillbaka helt.

Värk

Det kan hända att du känner dig öm och att det värker i munnen i ett par dagar. Värken ska minska efterhand. Ta vid behov smärtlindrande tabletter med paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil.

Kontakta oss

- Om du inte får stopp på blödningen eller om det börjar blöda igen efter ett tag.
- Om svullnad och gapsvårigheter inte minskar.
- Om du får svårigheter att svälja eller dricka.
- Om värken inte avtar.
- Om du får feber.